



**Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Чеченской Республике
e-mail:
grozny@rospotrebnadzor95.ru
тел.: 8 (8712) 29-41-89**



*Управление Роспотребнадзора
по Чеченской Республике
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чеченской Республике»*

САНПРОСВЕТ:

***ПРОФИЛАКТИКА
ОСПЫ ОБЕЗЬЯН***



<https://rospotrebnadzor95.ru/>

**г.Грозный
2024г**

Заражение человека

Происходит преимущественно при контакте с дикими животными, разделке их туш, употреблении в пищу мяса и субпродуктов без термической обработки.

Передача инфекции от человека к человеку происходит в основном при **тесном физическом контакте или воздушно-капельным путем**. Возможна передача вируса от матери ребенку через плаценту или в процессе родов.

Оспа обезьян – зоонозное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом оспы обезьян. Генетически этот вирус близок к вирусу натуральной оспы.

Источник инфекции – грызуны и приматы.



Инкубационный период

Длится 6 до 16 дней, но может достигать 21 дня.

Клинические проявления

оспы обезьян схожи с натуральной оспой однако менее серьезны:

Лихорадка

Слабость

Головные боли

Высыпания на коже

Увеличение лимфатических узлов

Мышечные боли

Боли в спине

В большинстве случаев симптомы исчезают самостоятельно через 2 – 4 недели.

Тяжелое течение заболевания встречается у лиц с иммунодефицитом.

Осложнения: бронхопневмония, заражение крови, энцефалит, инфекция роговицы, которая может привести к потере зрения.

Лечение проводится в стационаре, в большинстве случаев оно симптоматическое.

Меры профилактики

Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риск тяжелого течения оспы обезьян.

Доказательства вакцинации против натуральной оспы обычно можно найти в виде небольшого шрама на плече.

При посещении эндемичных стран*:

Избегайте контакта с животными, которые могут быть носителями вируса - грызунами и приматами

Употребляйте в пищу только термически обработанные продукты животного происхождения

По данным Всемирной организации здравоохранения, летальность при оспе обезьян составляет от 3 до 6%.

